

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

R

D

U

	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
RDU ขั้นที่ 1 60%	RDU ขั้นที่ 1 70%	RDU ขั้นที่ 1 80%	RDU ขั้นที่ 1 80%	
RDU ขั้นที่ 2 5%	RDU ขั้นที่ 2 10%	RDU ขั้นที่ 2 15%	RDU ขั้นที่ 2 20%	
		มีระบบจัดการ AMR	มีระบบจัดการ AMR	
		บูรณาการ 40%	บูรณาการ 70%	

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว

RDU ชั้นที่ 1 RDU1 : ผ่าน 8 แห่ง RDU2 : ผ่านทุกแห่ง

RDU 1 ชั้นที่ 1	ผลการดำเนินงาน									
	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง
1. ร้อยละการใช้ยา ED	M1-M2>ร้อยละ85 F1-F3>ร้อยละ90	91.04	91.03	93.81	96.12	92.35	94.34	96.12	86.22	93.93
2. ประสิทธิผล PTC	ระดับ 3ขึ้นไป	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3
3. มาตรฐานฉลากยา	ระดับ 3ขึ้นไป	ระดับ 5	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5
4. ยาที่ไม่ควรมี 8 ตัว	≤ 1ตัว	1 ตัว	1 ตัว	1 ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว
5. ส่งเสริมจริยธรรม	ระดับ 3ขึ้นไป	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3

RDU 2 ชั้นที่ 1 (รพ.สต.)	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง
ร้อยละของรพ.สต.มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ 40 ของรพ.สต. ผ่านเกณฑ์	77.27	87.50	100	93.33	71.43	100	71.43	100	100

RDU ชั้นที่ 2 RDU1 : ยังไม่มีรพ.ใดผ่าน

RDU2 : ผ่านทุกแห่ง

RDU 1 ชั้นที่ 2	ผลการดำเนินงาน									
	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง
1. การใช้อยาปฏิชีวนะใน URI ในรพ.	≤ ร้อยละ 20	39.91	30.26	34.34	35.11	30.44	18.68	28.20	36.11	20.44
2. การใช้อยาปฏิชีวนะใน AD ในรพ.	≤ ร้อยละ 20	27.75	25.04	39.37	30.64	24.19	12.66	19.11	34.12	22.95
3. การใช้อยาปฏิชีวนะในแผลสด ในรพ.	≤ ร้อยละ 40	68.15	70.94	73.42	67.37	47.91	45.77	39.54	52.10	51.65
4. การใช้อยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ	≤ ร้อยละ 10	37.83	12.50	10.19	1.96	5.83	6.41	10.00	0	0
5. การใช้ NSAIDs ใน CKD> stage 3	≤ ร้อยละ 10	0.79	2.77	1.21	0.13	0.25	0.60	1.06	1.20	9.40
6. การใช้ Gliben ในผู้สูงอายุ/โรคไต	≤ ร้อยละ 5	23.63	21.93	0	30.00	0	0	0	0	0
7. การห้ามใช้ยาบางชนิดในหญิงมีครรภ์	0 ราย	1	0	0	0	0	0	0	0	2

RDU 2 ชั้นที่ 1 (รพ.สต.)	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง
ร้อยละของรพ.สต.มีการใช้อยาปฏิชีวนะใน URI และ AD น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ 60 ของรพ.สต. ผ่านเกณฑ์	77.27	87.50	100	93.33	71.43	100	71.43	100	100

RDU ชั้นที่ 3 (ในภาพรวม ต้องมีรพ.ผ่าน 20% ปี 63 และ 80% ปี 64) : ยังไม่รพ.ใดผ่าน

RDU 1 ชั้นที่ 3	ผลการดำเนินงาน									
	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง
1. ผู้ป่วย HT ที่ใช้ยา RAS blocaad (ACEI/ARB/ Renin inh) 2 ชนิดร่วมกัน	ร้อยละ 0	0.03	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2. ผู้ป่วย DM ที่ใช้ยา metformin ในรพ.	≥ ร้อยละ 80	68.47	78.61	78.61	76.07	51.52	59.60	68.55	72.40	72.30
3. ผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน	≤ ร้อยละ 5	0.21	0.33	0	0	0	0.05	0.04	0.05	0.07
4. ผู้ป่วยโรคหืดที่ได้ inhal corticosteroid	≥ ร้อยละ 80	45.48	37.92	62.26	62.50	55.16	53.09	48.61	14.59	71.01
5. ผู้สูงอายุที่ใช้ยา long-act benzodiazepine	≤ ร้อยละ 5	1.82	1.07	1.62	1.79	1.61	0.42	1.15	0.55	0.72
6. เด็กที่ได้รับการวินิจฉัย & ใต่ยา non - sedating anti-histamine	≤ ร้อยละ 20	7.20	5.00	0	1.07	0	0.77	3.62	0	0

RDU 2 ชั้นที่ 1 (รพ.สต.)	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง
ร้อยละของรพ.สต.มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ 100 ของรพ.สต. ผ่านเกณฑ์	77.27	87.50	100	93.33	71.43	100	71.43	100	100

ติดตามผลการดำเนินงานผ่าน HDC Dashboard

