

แนวทางปฏิบัติภาวะโลหิตจางในคลินิกเด็กดี

เจาะ Hct เด็กอายุ ๙ เดือน ทุกราย

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการวินิจฉัย
ภาวะโลหิตจาง คือ Hct < ๓๕ % (กุมารแพทย์รพ.รามาธิบดี)

Hct < ๓๕ %

Hct ≥ ๓๕ %

รพ.รามาธิบดี และ รพ.สต.(CUPเมือง)
- ส่งพบกุมารแพทย์ที่ OPD เข้า รพ.รามาธิบดี
- ส่ง CBC, Reticulocyte Count ก่อนพบแพทย์

รพ.ที่ไม่มีกุมารแพทย์ และ รพ.สต.(นอกCUPเมือง)
- ส่งพบแพทย์ในรพ.ของ CUP ตนเอง
- ส่ง CBC, Reticulocyte Count ก่อนพบแพทย์

จ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กที่คลินิกเด็กดี :
Ferrous Fumarate Oral Suspension ๗๖ mg/๕mL ขวด (Ferrokid® elemental iron ๒๕ me)
- อายุ ๖ เดือน - ๒ ปี ให้ ๑/๒ ชช./wk.
- อายุ ๒ - ๕ ปี ให้ ๑ ชช./wk.
***กรณีเปลี่ยนบริษัทต้องคำนวณขนาดยาใหม่

หมายเหตุเพิ่มเติม
กรณีเด็กที่มีน้ำหนักแรกเกิด < ๒,๕๐๐ กรัม ตั้งแต่อายุ ๒ เดือนขึ้นไป

นั้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กที่คลินิกเด็กดี : **Ferrous Fumarate Oral Suspension ๗๖ mg/๕mL ขวด (Ferrokid® elemental iron ๒๕ me)**

- ทุก ๔ เดือน กรณีที่บ้านมีตู้เย็น
- ทุก ๓ เดือน กรณีที่บ้านไม่มีตู้เย็น