

การพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

RDU ชั้นที่ 1 RDU1 : ผ่านทุกแห่ง

RDU 1 ชั้นที่ 1	ผลการดำเนินงาน									
	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง
1. ร้อยละการใช้ยา ED	M1-M2>ร้อยละ85 F1-F3>ร้อยละ90	91.24	91.46	93.16	94.81	93.69	96.06	94.95	99.66	94.57
2. ประสิทธิภาพ PTC	ระดับ 3ขึ้นไป	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3
3. มาตรฐานฉลากยา	ระดับ 3ขึ้นไป	ระดับ 5	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5
4. ยาที่ไม่ควรมี 8 ตัว	≤ 1ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว	0 ตัว
5. ส่งเสริมจริยธรรม	ระดับ 3ขึ้นไป	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3

RDU ชั้นที่ 2 RDU1 : ผ่าน 2 แห่ง >>> เขาฉกรรจ์ และโคกสูง

RDU 1 ชั้นที่ 2	ผลการดำเนินงาน									
	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ	โคกสูง
1. การใช้ยาปฏิชีวนะใน URI ในรพ.	รพท ≤ ร้อยละ 30 รพช ≤ ร้อยละ 20	35.68	24.44	19.17	17.18	9.64	25.16	14.41	12.99	13.56
2. การใช้ยาปฏิชีวนะใน AD ในรพ.	≤ ร้อยละ 20	22.73	11.43	15.64	13.62	10.25	10.71	6.67	15.91	14.21
3. การใช้ยาปฏิชีวนะในแผลสด ในรพ.	≤ ร้อยละ 40	47.80	60.01	45.23	66.50	41.68	39.05	30.75	52.88	26.57
4. การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ	≤ ร้อยละ 10	10.34	14.09	7.14	0	0	0	6.67	0	0
5. การใช้ NSAIDs ใน CKD> stage 3	≤ ร้อยละ 10	1.55	1.21	0.81	0	0.53	0	0	0	0
6. การใช้ Gliben ในผู้สูงอายุ/โรคไต	≤ ร้อยละ 5	2.63	0	0	0	0	0	0	0	0
7. การห้ามใช้ยาบางชนิดในหญิงมีครรภ์	0 ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RDU ชั้นที่ 3 (ในภาพรวม ต้องมีรพ.ผ่าน 20% ปี 63) : ผ่าน 1 แห่ง >>> วังน้ำเย็น

RDU 1 ชั้นที่ 3	ผลการดำเนินงาน									
	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง
1. ผู้ป่วย HT ที่ใช้ยา RAS blocaad (ACEI/ARB/ Renin inh) 2 ชนิดร่วมกัน	ร้อยละ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ผู้ป่วย DM ที่ใช้ยา metformin ในรพ.	≥ ร้อยละ 80	92.00	93.79	93.78	93.00	94.30	92.59	91.89	91.67	85.73
3. ผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน	≤ ร้อยละ 5	0.06	0.15	0.10	0	0.05	0	0	0	0
4. ผู้ป่วยโรคหืดที่ได้ inhal corticosteroid	≥ ร้อยละ 80	56.06	79.79	77.45	74.51	80.74	76.58	70.40	75.00	73.91
5. ผู้สูงอายุที่ใช้ยา long-act benzodiazepine	≤ ร้อยละ 5	1.89	0.99	1.41	1.04	1.20	0.11	1.01	0.65	0.22
6. เด็กที่ได้รับการวินิจฉัย & ใต่ยา non - sedating anti-histamine	≤ ร้อยละ 20	7.76	8.35	0	6.57	0	3.43	0	0	0

RDU 2 (รพ.สต.)	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง
ร้อยละของ รพ.สต. ในเครือข่าย ระดับอำเภอที่ผ่านเกณฑ์	ชั้น 1 ≥ ร้อยละ 40 ชั้น 2 ≥ ร้อยละ 60 ชั้น 3 ≥ ร้อยละ 100	90.91	62.50	77.78	66.67	57.14	95.24	85.71	66.67	77.78
ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งโรค RI และ AD	ผ่านชั้นที่	2	2	2	2	1	2	2	2	2